






ŠKROPILNI PROGRAM ZA SADNO DREVJE NA VRTU V LETU 2014


Varstveni ukrep	Čas	Razvojni stadij	Bolezen ali škodljivec	Priporočeno sredstvo	Opomba
Predpomladansko škropljenje breskev, češenj in višenj	sredi marca	odpiranje brstov ff B-C	breskova kodravost, listna luknjičavost koščičarjev	Champion 50 WG ali Cuprablau-Z ali Cuprablau-Z ultra ali Bordojska brozga Caffaro	Če v tem času že brstijo hruške, češnje, višnje..., tudi njih poškopimo z isto škropilno brozgo.
			češpljev kapar, murvov kapar, ameriški kapar, jajčeca listnih uši	Frutapon ali Ogriol	
Jablana			jablanov škrlup	Champion 50 WG ali Cuprablau-Z ali Cuprablau-Z ultra ali Kupro 190 SC ali Nordox 75 WG	<u>Bakrovi pripravki lahko pri nizkih temperaturah povzročajo ožige!!</u>
Breskve			breskova kodravost,	Ziram 76 WG	
Ob koncu marca D - E					
1. škropljenje jablan proti j. škrlupu in j. pepelovki	v prvi dekadi aprila	začetek razvoja cvetnih pecljev ff D-E	jablanov škrlup	<u>Kontaktni fungicid:</u> Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit 400 SC ali Chorus 50 WG ali Mythos ali Pyrus	
					
			jablanova pepelovka	Cosan ali Kumulus ali Močljivo žveplo ali Pepelin ali Vindex	Močljiva žvepla dobro delujejo pri temp. nad 15°C.
			listne uši	<u>Pirimor 50 WG ali Teppeki</u>	
<u>Pripravek Pirimor 50 WG in Teppeki kažeta dober stranski učinek na krvavo uš.</u>					
Breskve	v prvi dekadi aprila		breskova kodravost	Syllit 400 SC ali Ziram 76 WG	
Če je v času brstenja breskev vreme deževno, škropimo breskve proti breskovi kodravosti skupaj 3x (zadnjič tik pred cvetenjem).					
2. škropljenje jablane (po 10 dneh) proti j. škrlupu in j. pepelovki	sredi aprila	cvetni peclji so razviti ff E-E ₂	jablanov škrlup	Chorus 50 WG ali Mythos ali Pyrus ali	
				Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit 400 SC	
			jablanova pepelovka	Cosan ali Kumulus ali Močljivo žveplo ali Pepelin ali Vindex	


Pred cvetenjem lahko uporabimo močljiva žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku.

Breskve, nektarine, marelice	cvetenje	cvetna monilija, plodova monilija	Chorus 50 WG ali Rovral Aquaflo ali Topsin-M	
Češnje in višnje		cvetna monilija, plodova monilija	Duaxo koncentrat ali Rovral Aquaflo ali Teldor SC 500 ali Topsin-M	<u>Prvič škropimo, ko je odprtih 10% cvetov; drugič, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.</u>
Slive in češplje		cvetna monilija, plodova monilija	Chorus 50 WG ali Octave ali Rovral Aquaflo ali Teldor SC 500 ali Topsin-M	

V času cvetenja ne uporabljamo pripravkov Syllit, Merpan in Orthocide!

V času cvetenja ni dovoljena uporaba pripravkov, ki so nevarni oz. strupeni za čebele!!!


3. škropljenje (po 10 dneh) proti j. škrlupu in j. pepelovki	v tretji dekadi aprila	začetek cvetenja ff F	jablanov škrlup	Kontaktni fungicid _Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit 400 SC	
					
			j. pepelovka	Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin, Močljivo žveplo, Vindex	

Slive in češplje	po končanem cvetenju		rumena in črna češpljeva grizlica	Mospilan 20 SG <u>Pokositi cvetočo podrast – VARSTVO ČEBEL!</u>	<u>Škropimo le, če se je med cvetenjem na bele lepljive plošče ujelo več kot 30 osic !!!</u> <u>VARSTVO ČEBEL!</u>
------------------	----------------------	---	--	---	---

Breskve in nektarine	po končanem cvetenju		listne uši	ali Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG ali Pirimor 50 WG ali Teppeki	<u>Škropimo samo napadena drevesa in če je napadenih več kot 5% poganjkov.</u> <u>VARSTVO ČEBEL!</u>
----------------------	----------------------	--	-------------------	---	---

Češnje in višnje	po končanem cvetenju		listne uši	Calypso SC 480 ali Neemazal-T/S	<u>VARSTVO ČEBEL!</u> <u>Upoštevati karenco</u>
------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------------------	--

Slive in češplje	po končanem cvetenju		listne uši	Mospilan 20 SG	<u>VARSTVO ČEBEL!</u>
------------------	----------------------	--	-------------------	----------------	------------------------------

4. škropljenje proti j. škrlupu, j. pepelovki, listnim ušem	v začetku maja	končano cvetenje ff H	jablanov škrlup	Kontaktni fungicid Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit 400 SC	
					
			jablanova pepelovka	Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin, Močljivo žveplo, Vindex	

ali
Topas 100 EC

**listne uši,
jab. grizlica**

Calypso SC 480 ali
Mospilan 20 SG

podrast – VARSTVO
ČEBEL!

**** Jabolčno grizlico zatiramo le, če se je med cvetenjem na bele lepljive plošče ujelo več kot 30 osic!!!**

***rdeča sadna
pršica**

Envidor
ali
Vertimec pro

**V času cvetenja
se priporoča
uporaba
pripravka
Calypso SC 480,
ki ni strupen za
čebele !!!**

***Envidor ali Vertimec pro lahko uporabimo šele po končanem cvetenju !!!**

Breskve	maj, junij in julij	breskov škrlup	Syllit 400 SC ali Kumulus DF
		breskova pepelovka	Uporabimo močljivo žveplo, npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin, Močljivo žveplo, Thiovit jet, Vindex ali Topas 100 EC

**5. škropljenje
proti
j. škrlupu
in j. pepelovki
(presledek
10-14 dni)**

sredi
maja

plodiči se
razvijajo
ff I-J



jablanov škrlup

Kontaktni fungicid
Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit
400 SC

**jablanova
pepelovka**

Uporabimo močljivo žveplo
(2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus,
Pepelin, Močljivo žveplo, Vindex
ali
Topas 100 EC

**6. škropljenje
jablane
proti j.
škrlupu,
j. pepelovki,
j. zavijaču**

v tretji
dekadi
maja

plodovi se
razvijajo
ff J



**jablanov škrlup
in j. pepelovka**

enaki pripravki kot
pri 4. škropljenju


Dodamo 2 kg/ha
močljivega žvepla
(Cosan, Kumulus,
Pepelin,...)

**jabolčni
zavijač
(Varstvo čebel!!!)**

Calypso SC 480 ali
Mimic ali Steward ali
Coragen
ali
Madex ali Carpovirusine

Calypso SC 480
deluje tudi proti
listnim ušem!

**Češnje in
višnje**



**črna
češnjava
uš**

Calypso SC 480 ali
Confidor 200 SL ali
Kohinor SL 200 ali
Neemazol-T/S

Škropimo le v
primeru, če je
napadenih 3% ali več
poganjkov.

VARSTVO ČEBEL!!!

KARENCA!!!

**7. škropljenje
jablane
proti
j. škrlupu,**

v prvi
dekadi
junija

junjsko
redčenje
plodov
ff J

**jablanov
škrlup**

Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit
400 SC

**j. pepelovki
in j. zavijaču**



**jablanova
pepelovka**

Uporabimo močljivo žveplo
(2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus,
Pepelin, Močljivo žveplo, Vindex
ali
Topas 100 EC

**jabolčni
zavijač**

Madex sli Madex max ali
Carpovirusine



Pripravek Madex, Madex max lahko dodamo insekticidu za zatiranje j. zavijača v odmerku 0,05 l/ha.

Breskve	junij, julij (zatiranje prvega in nadaljnjih rodov)		breskov zavijač	Affirm ali Coragen ali Lepinox plus ali Steward	<u>Pokositi cvetočo podrast - varstvo čebel!!!</u>
8. škropljenje jablane (14 dni po prejšnjem)	sredi junija	plodovi se razvijajo (debelijo)	jablanov škrlup	Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit 400 SC	
			jablanova pepelovka	<u>uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin...</u>	
			jabolčni zavijač in listne uši	Calypso SC 480	Škropimo samo po priporočilu javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Slovenije.
			jabolčni zavijač	Mimic ali Coragen ali Madex ali Madex max ali Carpovirusine	<u>Pokositi cvetočo podrast - varstvo čebel!!!</u>

Pripravek Madex ali Madex max lahko dodamo insekticidom za zatiranje zavijača.

Slive in češplje	Junij, julij in avgust		češpljev zavijač	Coragen	.
Češnje		začetek zorenja	češnjeva muha	<u>Nu lure + Mospilan 20 SG</u>	Pri zgodnejših sortah zatiranje ni potrebno. Škropimo samo spodnji del krošnje na sončni (južni) strani.

9. škropljenje jablan (14 - 18 dni po prejšnjem)	začetek do sredina julija	plodovi se razvijajo (debelijo)	jablanov škrlup	Dithane ali Merpan 80 WDG ali Syllit 400 SC	
			jablanova pepelovka	Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin, Močljivo žveplo...	

			jabolčni zavijač	Madex ali Madex max ali Carpovirusine	<u>Pokositi cvetočo</u>
					<u>podrast - varstvo čebel!!!</u>
10. škropljenje jablan (14 - 18 dni po prejšnjem)	začetek avgusta		jablanov škrlup	Bellis ali Merpan 80 WDG ali Boni protect	* proti skladiščnim boleznim (čopičaste plesni, navadna sadna gniloba, siva plesen)
			jabolčni zavijač	Madex ali Madex max ali Carpovirusine	<u>Pokositi cvetočo</u>
					<u>podrast - varstvo čebel!!!</u>
11. škropljenje (pozne sorte jablane)	konec avgusta - začetek septembra		jablanov škrlup in skladiščne bolezni	Bellis ali Boni protect	<u>Upoštevamo predpisane karence!</u>
Češnje in višnje		po obiranju	lukničavost koščičarjev	Merpan 80 WDG	
Breskve		v času odpadanja listja	ožig breskove skorje	Topsin-M	

V ŠKROPILNI KOLEDAR SMO UVRSTILI SAMO PRIPRAVKE, KI IMAJO ČIM ŠIRŠO REGISTRACIJO (npr. za pečkarje in koščičasto sadje). V ŠKROPILNI KOLEDAR NISMO UVRSTILI SISTEMIČNIH INSEKTICIDOV, KI SO STRUPENI ZA ČEBELE.

POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO NAMENITI VSEM OPOZORILOM, KI SO NAVEDENA V NAVODILU ZA UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA (št. dovoljenih tretiranj, fitotoksičnost, karenca, varnostni pasovi od voda I. in II. reda, varstvo čebel...).

PRED UPORABO PRIPRAVKA OBVEZNO NATANČNO PREBRATI PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA!!!